

Nieuws over de praktijk

Onze kliniek beschikt sinds een aantal maanden over een echo scanner. Echo diagnostiek is een waardevolle aanvullende vorm van diagnostiek, die ons veel informatie kan geven over de organen in de buik, en is nauwelijks belastend voor de patiënt. Rontgendiagnostiek en echodiagnostiek vullen elkaar prima aan, maar kunnen elkaar niet vervangen.

In de toekomst zullen wij ook echodiagnostiek van het hart gaan doen. Op dit moment doen wij vooral echo-onderzoek van de buik.



Echobeeld drachtige hond

In dit nummer:

Praktijknieuws 1

Hoge bloeddruk bij katten 1, 2

Tumoren bij konijnen 2

Winterperikelen 3

Tips feestdagen. 4



Een leuk berichtje:

Onze assistente Patricia is 7 oktober bevallen van een gezonde dochter.

Velen van u zullen haar nog wel gezien hebben voor haar zwangerschapsverlof.

Patricia zal naar verwachting begin 2014 weer aan het werk gaan.

Wij wensen haar en haar dochter Salina het allerbeste!

Hoge bloeddruk bij katten.

Hoge bloeddruk bij katten komt relatief vaak voor, maar kan gemakkelijk gemist worden, omdat het, tenzij de bloeddruk erg sterk verhoogd is, geen duidelijke symptomen veroorzaakt. Helaas is hoge bloeddruk wel schadelijk:

- bloedingen achter netvlies, blindheid.
- nierschade, eiwitverlies urine.
- beroerte ten gevolge van bloeding in hersenen.
- overbelasting hart.

Katten krijgen hoge bloeddruk meestal als gevolg van een ander ziektebeeld. De meest voorkomende oorzaken zijn chronisch nierfalen, en hyperthyreoïdie (hyperactieve schildklier ten gevolge van hormoonproducerende schildkliertumor). Primaire hoge bloeddruk, dus zonder aantoonbare onderliggende oorzaak, komt echter ook voor.

Hoge bloeddruk zien we vooral bij oudere katten, dit komt omdat de onderliggende ziektebeelden vooral bij oudere katten voorkomen.



Bloeddrukmeting
Bij de kat

50 tot 80% van
alle niet
gecastreerde
vrouwelijke dieren
ouder dan 4 jaar!

Het meten van de bloeddruk bij katten is daarom zinvol als screening, dus periodiek, bij alle oudere katten, alle katten met nierfalen of hyperthyreoïdie, en uiteraard alle katten met verschijnselen van hoge bloeddruk:

- plotselinge blindheid
- zichtbare afwijkingen netvlies
- eiwitverlies nieren
- hartruisje (bij oudere kat), andere hartproblemen.

In onze kliniek kunnen wij vrij eenvoudig de bloeddruk meten. Met een Doppler apparaat doen wij dan meerdere metingen achter elkaar, en kijken naar het gemiddelde. Als de druk duidelijk te hoog is, dan herhalen we de meting na een week. Als de druk te hoog blijft is medicatie nodig.

Met een eenmaal daagse dosering van amlodipine (Norvasc) is de bloeddruk meestal omlaag te krijgen zodat verdere schade aan nieren, ogen en zenuwstelsel kan worden voorkomen.

Het effect van de therapie moet gecontroleerd worden met periodieke bloeddrukmetingen.

Wilt u graag de bloeddruk van uw kat laten controleren, dan kunt u hier gewoon een afspraak voor maken.

Tumoren bij konijnen

Net als bij andere diersoorten komen tumoren helaas ook voor bij konijnen. Een soort tumor komt bij konijnen echter bijzonder vaak voor, namelijk tumoren van de baarmoeder bij vrouwelijke dieren.

In wetenschappelijke studies worden percentages genoemd van 50 tot 80% van alle niet gecastreerde vrouwelijke dieren ouder dan 4 jaar!

Meest voorkomende symptomen zijn: bloed bij de urine, bloederige vaginale uitvloeiing, en in latere stadia van de ziekte algeheel ziek zijn: suf, slecht eten, vermageren, benauwdheid.

De baarmoedertumoren zijn kwaadaardig en zaaien op den duur (na 1 tot 2 jaar) uit naar andere organen, zoals de longen, lever, botten.

Gelukkig is dit ziektebeeld eenvoudig te voorkomen, door alle vrouwelijke konijnen liefst voor de leeftijd van 2 jaar te castreren. (Deze ingreep wordt vaak sterilisatie genoemd, maar is in feite een castratie, omdat de eierstokken verwijderd worden)

Bijkomende voordelen van castratie:

- de konijnen worden minder agressief/dominant en ten opzichte van mensen en andere konijnen.
- voorkomen van ongewenste zwangerschap.
- voorkomen van baarmoederontsteking.
- voorkomen van hormonale problemen door cysteuze eierstokken.



Daarom adviseren wij om alle vrouwelijk konijnen (voedsters) vanaf 6 maanden, maar liefst voor 2 jaar, te laten castreren. Dit omdat na 2 jaar het risico op genoemde tumoren ook al verhoogd is, zij het niet zo hoog als na 4 jaar.

Een paar tips om uw huisdieren goed de koude winterperiode door te helpen.

Honden en katten kunnen best naar buiten in de kou, maar er zijn wel wat aandachtspunten. Om niet te koud te worden is het belangrijk om in beweging te blijven. Katten moeten naar binnen kunnen als ze het koud krijgen bijvoorbeeld door een kattenluikje. Honden lekker in beweging houden en goed afdrogen als ze nat zijn. Gezonde honden zullen dan meestal geen last van de kou hebben, maar voor oude en zieke dieren of honden met een heel korte vacht zijn er dekjes of jasjes in de handel, die soms heel zinvol kunnen zijn.

De poten van de hond verdienen extra aandacht. Als er sneeuw ligt kunnen er tijdens het wandelen makkelijk sneeuwklompjes tussen de tenen ontstaan, wat heel pijnlijk loopt voor de hond. Ze gaan dan vaak opeens met een poot omhoog staan. Om dit te voorkomen kun je het best zorgen dat de haren tussen de tenen kort zijn. Voor de wandeling kun je zuurvrije vaseline tussen de tenen smeren aan de onderzijde van de voet, waardoor de sneeuw hier minder makkelijk klonten vormt. Een tweede reden voor irritatie van de huid tussen de tenen is de pekkel waarmee in de winter gestrooid wordt. Het beste kun je de huid tussen de tenen geregeld controleren. Om irritatie door pekkel tegen te gaan kun je na de wandeling de voetjes van de hond met lauw water afspoelen en goed afdrogen.

Pas op met honden op en bij het ijs. Het risico van door het ijs zakken is altijd aanwezig.

Probeer sneeuw eten te voorkomen. Dit kan maagklachten geven. Bij sneeuwballen gooien met een hond zal ook de kans bestaan dat de hond de nodige sneeuw binnen krijgt. Een ander jaarlijks terugkerend probleem is de aantrekkingskracht van vetbollen op veel honden. Voor de vogels zijn vetbollen in de winter plezierig, maar hang ze voldoende hoog, want ook honden krijgen ze geregeld te pakken. Een grote bonk vet, vaak inclusief netje, is niet bevorderlijk voor het maagdarm kanaal.

Konijnen die altijd buiten zitten, kunnen in de winter ook buiten blijven. Wel hebben ze goede beschutting nodig tegen wind, regen en koude. Denk hierbij aan extra strooisel in het nachthok en voorkomen dat de wind hier rechtstreeks binnen waait. Konijnen zijn erg gevoelig voor temperatuurswisselingen. Je kunt ze dus beter niet zomaar van binnen naar buiten en andersom verplaatsen. Dieren die in de winter buiten verblijven hebben natuurlijk wel drinkwater nodig. Daarom is het advies bij vorst minimaal 2x per dag het drinkwater te controleren op bevriezing. Beter kun je in de winter een bakje water gebruiken dan een drinkfles, omdat hiervan de drinknippel snel kan bevriezen, waardoor het dier geen water meer tot zijn beschikking heeft.

Een laatste zeer belangrijk punt is het gevaar voor huisdieren van antivries, dat gebruikt wordt voor de auto in ruitensproeiervloeistof en koelvloeistof. Antivries smaakt zoet en wordt door honden makkelijk opgedronken/opgelikt.



Ook katten kunnen het oplikken of binnenkrijgen door het wassen van hun pootjes als ze er door heen gelopen hebben. Antivries is zeer giftig en kan in kleine hoeveelheden al dodelijk zijn.

Het veroorzaakt nierschade en nierfalen, al vrij snel na inname. Het eerste verschijnsel wat te zien is, zal meestal braken zijn. Verder zijn de dieren beroerd en misselijk, drinken en plassen meer. Snel ingrijpen door de dierenarts kan nog levensreddend zijn.





Dierenkliniek Ter Gouwe

Adres: Ooitas 5
Telefoon: 0164-237621
Fax: 0164-255086
E-mail: info@dierenkliniktergouwe.nl

Persoonlijke klant- en diervriendelijke zorg, voor een scherpe prijs.

Tips voor de feestdagen.

Met sinterklaas en kerst wordt er altijd wel wat lekkers in huis gehaald, zoals chocoladeletters. Chocolate is giftig voor honden, dus het is belangrijk erop te letten dat u het op een voor de hond onbereikbare plek opbergt.

Met feestmaaltijden wordt er vaak van een gourmetstel of tafelgrill gebruik gemaakt. Deze apparaten hebben een antiaanbaklaag, waar voor vogels giftige dampen vanaf komen. Gebruik daarom een dergelijk apparaat niet in dezelfde ruimte waar uw vogels zitten.



Gebruik als kerstversiering geen eetbare zaken, gebruik liefst onbreekbare kerstversieringen, en voorkom dat er ophanghaakjes van kerstballen achter blijven. Als uw hond of kat ze binnenkrijgt kunnen ze een darmperforatie veroorzaken.

Let op dat uw huisdieren niet aan de bedrading van kerstverlichtingen kunnen knagen.

Veel planten, waaronder ook hulst en kerstster, zijn giftig bij opname. Ook het water waar de kerstboom in staat kan maagdarmlachten veroorzaken.

Ook oud en nieuw met zijn vuurwerkperikelen komt er weer aan. Hiervoor verwijs ik terug naar een vorige [nieuwsbrief](#) van 29-11-2012, of de website: [vuurwerkangst](#)