

Vuurwerkangst bij hond en kat

Ieder najaar komt dit probleem helaas weer terug, en na soms al na 1 of soms meerdere slechte ervaringen kan dit al een echt fobie worden bij honden. De angst en stress die hierbij ontstaat is een flink probleem. Mede ook omdat het geknal zich niet beperkt tot oudejaarsavond.

Algemene tips zijn:

- Zorg voor een veilige plek waar uw hond of kat zich kan terugtrekken.
- Sluiten ramen en gordijnen.
- Laat de verlichting in het huis aan en zet de radio of TV zachtjes aan.
- Laat uw hond of kat niet alleen.
- Geef steun maar ga angstig gedrag niet extra stimuleren door te troosten.
- Zorg voor afleiding en geef bijvoorbeeld wat lekkers of speeltje.

NIET STRAFFEN! Dit vergroot de angst alleen maar meer..

Daarnaast bestaan er angst en stress verminderende voedinssupplementen en voeders. NB: hiermee moet tenminste 1 maand van tevoren gestart worden.

Gedragtherapie kan ook helpen, maar hiervoor heeft u meestal zelfs maanden de tijd nodig (trainen met vuurwerkgeluiden-CD).

Uiteraard zijn er ook medicijnen die rond oud en nieuw gegeven kunnen worden. **NB: Het voorheen meest voorgeschreven middel alprazolam mogen wij als dierenarts tegenwoordig NIET meer zo maar voorschrijven.** Dit is omdat alprazolam een humaan medicijn is, en er tegenwoordig ook geregistreerde diergeneesmiddelen zijn voor deze indicatie. Wij zijn daarom wettelijk verplicht om die geregistreerde medicatie te gebruiken, en alleen bij uitzonderingen mogen wij alprazolam voorschrijven. De nieuwe medicijnen die wij kunnen voorschrijven zijn Pexion tabletten (NB: hier moet u 2 dagen van tevoren mee starten!), en Sileo. Sileo is een gel die met een injector op het wangslimvlies aangebracht moet worden.

Alle informatie is terug te vinden op onze [website](#).



In dit
nummer:

Vuurwerk-
angst 1

Vacciecheck 2

Zorg oudere
dieren 3

Senior Care
Programma 4

Nestje fok-
ken hond of
kat 5

pijnstillers 6

Vaccicheck



De vaccicheck is een bloedonderzoek dat wij kunnen doen bij honden om de actuele weerstand tegen enkele belangrijke ziekteverwekkers te testen. Dit betreft hondenziekte (Distemper), leverziekte (Hepatitis contagiosa canis), en Parvo.

Wij kunnen de vaccicheck inzetten volgens 3 verschillende strategieën:

1-Bij jonge pups vanaf 6 weken elke 3 weken testen om het optimale tijdstip van de eerste vaccinatie te bepalen. Deze optie is arbeidsintensief maar hierbij kan men volstaan met slechts 1 x vaccineren van de pup!

2-Controle van de weerstand van de pup na het doorlopen van het reguliere vaccinatieschema. Deze test, welke dan gedaan wordt op de leeftijd van 20-25 weken, is altijd verstandig, omdat er is gebleken dat een klein deel v.d. pups onvoldoende weerstand opbouwt, ook al is netjes gevaccineerd met 6,9 en 12 weken. Dit kan omdat de maternale immuniteit (weerstand die via de moedermelk is verkregen) het aanslaan van de vaccinaties kan belemmeren.

3-Testen van oudere dieren om te bepalen of ze ten tijde van de jaarlijkse vaccinatie de gehele cocktail nodig hebben, of dat een kleinere vaccinatie met alleen ziekte van Weil en kennelhoest volstaat. Belangrijke componenten van de grote cocktail bieden namelijk vaak langer bescherming dan ziekte van Weil en kennelhoest en hoeven daarom veel minder vaak gegeven te worden. (ziekte van Weil en kennelhoest moet wel altijd jaarlijks gegeven worden voor een goede weerstand)

De dierenartsen Steffie Snijdelaar en Eric Nagel hebben in 2018 een cursus gedaan inclusief een kennistest, en zijn daarmee erkend "vaccicheck dierenarts". Dit betekent dat wij u goed kunnen adviseren in het strategisch inzetten van de vaccicheck, de test goed kunnen uitvoeren en interpreteren.

Meer info: [website pagina vaccinaties](#), [titeren bij pups](#)

Met het strategisch inzetten van de vaccicheck kan men de hoeveelheid vaccinaties beperken!

VACCICheck
METEN=WETEN



WWW.VACCICHECK.NL

Aandacht voor onze oudere dieren.

Ouderen honden en katten gaan net als oudere mensen meer gezondheidsklachten vertonen. Bij onze huisdieren zien we erg vaak gebitsproblemen, tumorziektes, internistische ziektebeelden, artrose en dementie.

Gebitsproblemen zien we eigenlijk bijna bij alle oudere honden en katten in meerdere of mindere mate. Vaak is een professionele gebitssanering nodig om het gebit weer zo gezond mogelijk te krijgen, liefst gevolgd door dagelijkse gebitshygiëne in de vorm van tandenpoetsen. Wanneer poetsen geen optie is kunnen wij u adviseren over diverse alternatieven.

NB: honden en katten tonen vaak niet dat zij gebitsproblemen hebben!!!

Ze blijven over het algemeen gewoon dooreten, tenzij de gebitsproblemen zeer heftig zijn. Goed eten is dus geen graadmeter voor een gezond gebit!

Wat wij regelmatig horen is dat deze dieren na een gebitssanering vrolijker zijn, wat een aanwijzing is dat zij daarvoor mogelijk chronische pijnklachten hadden van het gebit.



Een slecht gebit is daarnaast ook slecht voor de algehele gezondheid. Ontstoken tandvles is een bron van infecties die elders in het lichaam problemen kunnen geven.

Tumorziekten zien wij helaas vrij vaak bij honden en katten. Juist bij kanker is een vroegtijdige diagnose en behandeling erg belangrijk voor de prognose! Veel vormen van kanker zijn bij vroegtijdig ingrijpen nog te genezen of langdurig onder controle te houden.

Interne ziekten zijn onder andere verminderde nierfunctie, suikerziekte, hyperfunctie van de schildklier en ziekte van Cushing, allemaal ziektes die we met name bij oudere dieren aantreffen. Ook hierbij geldt weer dat een vroegtijdige behandeling gunstig is voor de levensduur en de kwaliteit van leven. Voor meer info over deze ziektebeelden kunt u de betreffende webpagina's van onze website bezoeken.

Artrose is een typisch ziektebeeld van oudere dieren, het immers een vorm van slijtage van de gewrichten. Door erfelijke aanleg, trauma, overgewicht, en infecties kan er sprake zijn van versnelde slijtage en artrose op jongere leeftijd.

Senior Care Programma

Bij artrose ontstaat er een ontstekingsreactie in het betreffende gewricht, wat kan leiden tot gewrichtsovervulling, reactie van betrokken botten met nieuwvorming van bot aan de gewrichtsranden, en wat vooral opvalt: pijnklachten en kreupelheid. De klachten zijn chronisch en progressief, en zullen dus erger worden als het dier ouder wordt.

Artrose kan dusdanig ernstige vormen aannemen dat de kwaliteit van leven zo slecht wordt dat voor euthanasie gekozen moet worden.

Gelukkig zijn er ook veel mogelijkheden om de vorming van artrose te beperken en te behandelen. U kunt hierbij denken aan gewichtsbepanking, voedingssupplementen, pijnstillers, en injecties ter verbetering van de bespiering.

Behandeling van artrose is vaak een combinatie van meerdere opties, en is vaak maatwerk. Een goede begeleiding van onze kant en inzet van de eigenaar is belangrijk voor een optimaal resultaat.



Dementie uit zich bij honden en katten net als bij mensen in afwijkend, gedesoriënteerd gedrag. Helaas bestaat er nog geen behandeling voor dementie, maar er zijn wel mogelijkheden om bijvoorbeeld toegenomen verlatingsangst bij honden (wat regelmatig voorkomt als gevolg van dementie) te behandelen met medicijnen.

Om genoemde ouderdomsklachten goed te kunnen begeleiden, onderzoeken en behandelen bieden wij de service van het **Senior Care Programma**.

Dit programma is aan te raden voor honden vanaf 8 jaar (reuze rassen vanaf 7 jaar) en katten vanaf 8 jaar. Dieren die in dit programma meedoen zien wij hiervoor tenminste 2x per jaar voor een algeheel lichamelijk onderzoek, en tijdens 1 van deze onderzoeken doen wij ook urine- en bloedonderzoek.

Doel van deze onderzoeken is om genoemde ouderdomsziekten in een vroeg stadium te diagnosticeren en te behandelen, zodat de levensduur en de kwaliteit van leven verbeterd kan worden!

Kijk voor meer informatie eens op onze website: [senioren informatie](#)

Begeleiding bij het fokken van honden

Pagina 5

Een nestje honden fokken is uiteraard een leuke en spannende ervaring, maar er komt erg veel bij kijken en het kost ook zeer veel tijd. Een goede voorbereiding en planning is noodzakelijk om de zeer drukke tijd tijdens en na de bevalling goed te laten verlopen.

Indien u een nestje wil fokken binnen de rasvereniging (met stamboom) dan moet u aan de vereisten van de betreffende rasvereniging voldoen. Voor verschillende

rassen zijn verschillende eisen, zoals screening van ziekten bij de ouderdieren.

Er worden natuurlijk ook regelmatig nestjes gefokt zonder stamboom.

Daarnaast moet u natuurlijk passende huisvesting hebben voor het aankomende nestje, liefst een werpkist en een warmtelamp.

Een handig naslagwerkje om u goed voor te bereiden is de fokkerswijzer, welke via [deze site](#) te bestellen is.



Wij kunnen bij veel belangrijke zaken hulp bieden:

- Progesteronbepalingen bij de teef om het beste moment van dekking te bepalen.
- Zwangerschapscontrole door middel van echo-onderzoek.
- Herpesvaccinaties bij de zwangere teef.
- Informatie, begeleiding en advies tijdens de zwangerschap en met name tijdens de bevalling.
- Uitvoeren van een keizersnede indien nodig bij een niet goed verlopende bevalling.
- Nestcontrole aan huis kort na de bevalling.
- Informatie, begeleiding en advies bij het verzorgen van de pups.
- Zo nodig behandelen en bijvoeden van zieke pups.
- Chippen en vaccineren van een nestje pups.

Wij bieden deze service aan voor zowel professionele fokkers, als mensen die incidenteel een nestje willen fokken.

Bovenstaande service bieden wij uiteraard ook voor katten!

Enkele punten zijn dan echter niet van toepassing





Dierenkliniek Ter Gouwe

Adres: Ooitas 5
Telefoon: 0164-237621
E-mail: info@dierenkliniektergouwe.nl

Persoonlijke klant- en diervriendelijke zorg, voor een scherpe prijs.

Langdurig gebruik van pijnstillers.

Veel oudere dieren, met name honden, krijgen wel eens langdurig pijnstillers, meestal vanwege artrose klachten. Langdurig gebruik hiervan vergroot het risico op bijwerkingen. Meest voorkomende bijwerkingen zijn misselijkheid en braken vanwege een potentieel nadelig effect op het slijmvlies van maag en darmen, en schade aan de nieren bij dieren die al verminderde nierfunctie hebben of bij dieren die een slechte vochtbalans hebben door andere oorzaken.

Om deze zaken te voorkomen is het verstandig om de dosering op effect te proberen af te bouwen naar een lagere onderhoudsdosering. Dit is helaas niet altijd mogelijk, sommige dieren hebben gewoon de volle dosering nodig voor het gewenste effect.

Gewichtsverlies en gebruik van voedings-supplementen voor een betere gewrichtsfunctie kunnen helpen om het gebruik van pijnstillers te verminderen.

Daarnaast is het altijd aan te raden om bij langdurig gebruik van pijnstillers 2xper jaar de nierfunctie te laten controleren d.m.v. bloedonderzoek.

Bij afwijkende uitslagen kunnen wij dan tijdig de keuze en dosering van de medicatie aanpassen om verdere nierschade te voorkomen.

